

PRAVI KOTANJ (*Castanea sativa Mill.*)

MARSOL je pravi kostanj francoske sorte, naravni križanec evropskega in japonskega kostanja. Raste zelo bujno, precej pokončno.

Rodnost je srednja. Odporen proti spomladanskemu in jesenskem mrazu in malo občutljiv za črnilovko. Cveti zgodaj.

Oprašuje ga sorta *precoce migouele* in še nekatere druge. Zori v začetku oktobra. V ježici razvijejo dva do trije normalni plodovi, ki so okroglasto trikotne oblike, svetle rdečkasto rjave barve.

Tehtajo povprečno 13 -15 g (80 - 67 plodov v 1 kg).

BOUCHE DE BETIZAC: Drevo je srednje bujno in pokončno. Občutljiv je za spomladanske pozebe in dokaj odporen na kostanjevega raka.

Zarodi zgodaj nato rodi redno in dobro. Zori konec septembra oz. začetek oktobra.

Razvije dva normalna plodova v ježici. Plod je velik in ploščat, široko eliptične oblike, temno rdečkastorjave barve.

MARVAL: je pravi kostanj francoske sorte, naravni križanec evropskega in japonskega kostanja.

Drevo je srednje bujne, rahlo pokončne rasti. Cveti srednje zgodaj. Oprašujeta ga sorti *precoce migouele* in *marigoule*. Zori v drugi dekadi oktobra.

V ježici sta en ali dva normalno razvita ploda, redkeje trije. Plod je zelo velik, v povprečju tehta 15 - 17 g (67 - 59 plodov v 1 kg).

Je široko eliptične trikotne oblike, svetleče, temno rjavo rdečkaste barve, z rahlimi prizami. Najmanj 95 % plodov je monoembrionalnih. Testa se ne zajeda v jedro.

NAVODILO ZA SAJENJE

- Razdalja sajenja 10 x 10 m ali več.
- Sadilna jama za pravi kostanj naj bo široka 1m in globoka 0,5m.
- Sadike sadimo enako globoko kot so bile posajene v drevesnici.
- Priporočljivo je sajenje v zaščitno mrežo proti voluharju.
- **Priporočljivo je dodajanje humusa dobljenega izpod kostanjevih dreves.**
- Korenine zasujemo s humusno zemljo brez dodajanja gnojil.
- Zemljo, pripravljeno za pravi kostanj z nogami rahlo pritisnemo h koreninam.
- Morebitni hlevski gnoj (2-3 vile) dodamo tik pred dodajanjem zadnjih 2 cm plasti zemlje. Gnoj ne sme priti v stik s koreninami oziroma s samo rastlino.
- Mineralno (umetno) gnojilo ob sajenju ne smemo dodajati. Uporabimo ga lahko šele tretje leto po sajenju.
- Sadike za pravi kostanj po sajenju po potrebi zalijemo z vodo.